

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ТЕМОЗОЛОМИД

Регистрационный номер: ЛП-004068

Торговое наименование: ТЕМОЗОЛОМИД

Международное непатентованное наименование: Темозоломид

Лекарственная форма: капсулы

Состав: 1 капсула содержит:

Дозировка 20 мг. Действующее вещество: темозоломид 20 мг.

Вспомогательные вещества: лактоза безводная, карбоксиметилкрахмал натрия, стеариновая кислота, винная кислота, кремния диоксид коллоидный, твердая желатиновая капсула [корпус: титана диоксид (E171), желатин; крышечка: титана диоксид (E171), краситель железа оксид желтый (E172), индигокармин (E132), желатин].

Дозировка 100 мг. Действующее вещество: темозоломид 100 мг.

Вспомогательные вещества: лактоза безводная, карбоксиметилкрахмал натрия, стеариновая кислота, винная кислота, кремния диоксид коллоидный, твердая желатиновая капсула [корпус: титана диоксид (E171), желатин; крышечка: титана диоксид (E171), краситель пунцовый 4R, краситель железа оксид красный (E172), желатин].

Дозировка 140 мг. Действующее вещество: темозоломид 140 мг.

Вспомогательные вещества: лактоза безводная, карбоксиметилкрахмал натрия, стеариновая кислота, винная кислота, кремния диоксид коллоидный, твердая желатиновая капсула [корпус: титана диоксид (E171), желатин; крышечка: титана диоксид (E171), индигокармин (E132), желатин].

Дозировка 180 мг. Действующее вещество: темозоломид 180 мг.

Вспомогательные вещества: лактоза безводная, карбоксиметилкрахмал натрия, стеариновая кислота, винная кислота, кремния диоксид коллоидный, твердая желатиновая капсула [корпус: титана диоксид (E171), желатин; крышечка: титана диоксид (E171), краситель железа оксид желтый (E172), желатин].

Дозировка 250 мг. Действующее вещество: темозоломид 250 мг.

Вспомогательные вещества: лактоза безводная, карбоксиметилкрахмал натрия, стеариновая кислота, винная кислота, кремния диоксид коллоидный, твердая желатиновая капсула [корпус: титана диоксид (E171), желатин; крышечка: титана диоксид (E171), краситель желтый «солнечный закат» FCF (E110), желатин].

Описание

Дозировка 20 мг. Твердые желатиновые капсулы № 2 с корпусом белого цвета и крышечкой зеленого цвета.

Дозировка 100 мг. Твердые желатиновые капсулы № 1 с корпусом белого цвета и крышечкой красного цвета.

Дозировка 140 мг. Твердые желатиновые капсулы № 1 с корпусом белого цвета и крышечкой голубого цвета.

Дозировка 180 мг. Твердые желатиновые капсулы № 0 с корпусом белого цвета и крышечкой желтого цвета.

Дозировка 250 мг. Твердые желатиновые капсулы № 0 с корпусом белого цвета и крышечкой оранжевого цвета.

Содержимое капсул – порошок от белого до светло-розового или светло-коричневого с желтоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа: противоопухолевое средство, алкилирующее соединение

Код АТХ: L01AX03

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Темозоломид – это имидазотетразиновый алкилирующий препарат, обладающий противоопухолевой активностью. При попадании в системную циркуляцию при физиологических значениях pH он подвергается быстрому химическому превращению с образованием активного соединения – монометилтриазеноимидазолкарбоксиамида (МТИК). Считается, что цитотоксичность МТИК обусловлена в первую очередь алкилированием гуанина в положении O⁶ и дополнительным алкилированием в положении N⁷. По-видимому, возникающие при этом цитотоксические повреждения включают (запускают) механизм аберрантного восстановления метилового остатка.

Фармакокинетика

Темозоломид после приема внутрь быстро всасывается и также быстро выводится из организма с мочой. Темозоломид быстро проникает через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и попадает в спинномозговую жидкость. Максимальная концентрация (C_{max}) в плазме достигается в среднем через 0,5–1,5 ч (самое раннее – через 20 минут) после приема препарата. Период полувыведения (T_{1/2}) из плазмы составляет примерно 1,8 ч. Клиренс, объем распределения в плазме и T_{1/2} не зависят от дозы. Темозоломид слабо связывается с белками (12–16 %). После перорального приема темозоломида средняя степень выведения

с фекалиями в течение 7 дней составляла 0,8 %, что свидетельствует о полном всасывании препарата. Основной путь выведения темозоломида – через почки. Через 24 ч после перорального приема приблизительно 5–10 % дозы определяется в неизменном виде в моче; остальная часть выводится в виде 4-амино-5-имидазолкарбоксамида гидрохлорида (АИК), темозоломидовой кислоты или неидентифицированных полярных метаболитов.

Прием темозоломида вместе с пищей вызывает снижение $C_{\max}$ на 33 % и уменьшение площади под кривой «концентрация–время» (AUC) на 9 %.

Клиренс препарата в плазме крови не зависит от возраста, функции почек или потребления табака. Фармакокинетический профиль препарата у пациентов с нарушением функции печени слабой или средней степени такой же, как и у лиц с нормальной функцией печени. У детей показатель AUC выше, чем у взрослых. Максимальная переносимая доза (МПД) у детей и взрослых оказалась одинаковой и составила 1000 мг/м² на один цикл лечения.

Показания к применению

- Впервые выявленная мультиформная глиобластома – комбинированное лечение с лучевой терапией с последующей адъювантной монотерапией;
- злокачественная глиома (мультиформная глиобластома или анапластическая астроцитома), при наличии рецидива или прогрессирования заболевания после стандартной терапии;
- распространенная метастазирующая злокачественная меланома – в качестве терапевтического средства первого ряда.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к темозоломиду или другим компонентам препарата, а также к дакарбазину (ДТИК);
- выраженная миелосупрессия;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 3-х лет (рецидивирующая или прогрессирующая злокачественная глиома) или до 18 лет (впервые выявленная мультиформная глиобластома или злокачественная меланома).

С осторожностью

- Пожилой возраст (старше 70 лет);
- нарушение функции почек или печени тяжелой степени;

- редкие наследственные заболевания, такие как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат ТЕМОЗОЛОМИД противопоказан беременным женщинам. Пациентки, применяющие препарат, должны быть осведомлены о потенциальной опасности для плода в случае, если беременность наступает во время лечения препаратом ТЕМОЗОЛОМИД.

Неизвестно, проникает ли темозоломид в грудное молоко, поэтому необходимо прекратить либо кормление грудью, либо терапию препаратом ТЕМОЗОЛОМИД.

Необходимо сообщить беременным женщинам о потенциальном риске для плода. Женщинам с репродуктивным потенциалом необходимо рекомендовать использование эффективной концентрации во время лечения препаратом ТЕМОЗОЛОМИД и в течение не менее 6 месяцев после приема последней дозы. Вследствие потенциального риска генотоксического действия на сперматозоиды необходимо рекомендовать использовать презервативы пациентам-мужчинам с партнершами-женщинами с репродуктивным потенциалом во время лечения препаратом ТЕМОЗОЛОМИД и в течение, как минимум, 3 месяцев после приема последней дозы. Необходимо рекомендовать пациентам-мужчинам не сдавать сперму во время лечения препаратом ТЕМОЗОЛОМИД и в течение, как минимум, 3 месяцев после приема последней дозы.

Способ применения и дозы

Препарат ТЕМОЗОЛОМИД принимают внутрь, натощак, не менее чем за 1 ч до приема пищи. Назначенная доза должна быть принята с использованием минимально возможного числа капсул. Капсулы нельзя вскрывать или разжевывать, а следует проглатывать целиком, запивая стаканом воды.

Впервые выявленная мультиформная глиобластома

Лечение взрослых пациентов (старше 18 лет). ***Первичное лечение*** проводят ***в комбинации с лучевой терапией***. Препарат ТЕМОЗОЛОМИД применяется в дозе 75 мг/м² ежедневно в течение 42 дней одновременно с проведением лучевой терапии (30 фракций в суммарной дозе 60 Гр) с последующими 6 циклами адъювантной терапии.

Снижение дозы не рекомендуется, однако прием препарата может прерываться в зависимости от переносимости. Возобновление приема препарата ТЕМОЗОЛОМИД возможно на протяжении всего 42-дневного периода комбинированного лечения и вплоть до 49 дня, но только при соблюдении всех перечисленных ниже условий:

- абсолютное количество нейтрофилов – не ниже $1,5 \times 10^9/\text{л}$;
- количество тромбоцитов – не ниже $100 \times 10^9/\text{л}$;

- критерий токсичности (СТС) не выше степени 1 (за исключением алопеции, тошноты и рвоты).

Во время лечения следует еженедельно проводить исследование крови с подсчетом количества клеток. Рекомендации по снижению дозы или отмене препарата ТЕМОЗОЛОМИД во время комбинированной фазы лечения даны в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендации по снижению дозы или отмене препарата ТЕМОЗОЛОМИД при комбинированном лечении с лучевой терапией

Критерий токсичности (СТС)	Перерыв в приеме препарата ТЕМОЗОЛОМИД*	Прекращение приема препарата ТЕМОЗОЛОМИД
Абсолютное количество нейтрофилов	$\geq 0,5 \times 10^9/\text{л}$, но $< 1,5 \times 10^9/\text{л}$	$< 0,5 \times 10^9/\text{л}$
Количество тромбоцитов	$\geq 10 \times 10^9/\text{л}$, но $< 100 \times 10^9/\text{л}$	$< 10 \times 10^9/\text{л}$
СТС (негематологическая токсичность за исключением алопеции, тошноты и рвоты)	Степень 2	Степень 3 или 4

*Возобновление приема препарата ТЕМОЗОЛОМИД возможно при соблюдении всех перечисленных ниже условий: абсолютное количество нейтрофилов – не ниже $1,5 \times 10^9/\text{л}$, количество тромбоцитов – не ниже $100 \times 10^9/\text{л}$, СТС - не выше степени 1 (за исключением алопеции, тошноты и рвоты).

Адьювантная терапия назначается спустя 4 недели после завершения комбинированной терапии и проводится в виде 6 дополнительных циклов.

Цикл 1: препарат ТЕМОЗОЛОМИД назначается в дозе $150 \text{ мг}/\text{м}^2$ в течение 5 дней с последующим 23-дневным перерывом в лечении.

Цикл 2: доза препарата ТЕМОЗОЛОМИД может быть увеличена до $200 \text{ мг}/\text{м}^2$ в день, при условии, что при первом цикле лечения выраженность негематологической токсичности (в соответствии со шкалой токсичности СТС) не превышала степени 2 (за исключением алопеции, тошноты и рвоты), при этом абсолютное количество нейтрофилов было не ниже $1,5 \times 10^9/\text{л}$, а количество тромбоцитов – не ниже $100 \times 10^9/\text{л}$. Если в цикле 2 доза препарата ТЕМОЗОЛОМИД не была увеличена, ее не следует увеличивать и в следующих циклах. Если в цикле 2 доза была $200 \text{ мг}/\text{м}^2$, в такой же суточной дозе препарат назначается и в следующих циклах (при отсутствии токсичности). В каждом цикле прием препарата ТЕМОЗОЛОМИД осуществляют в течение 5 дней подряд с последующим 23-дневным перерывом. Рекомендации по снижению дозы в адьювантной фазе лечения даны в таблицах 2 и 3. На 22 день лечения (21 день после приема первой дозы препарата ТЕМОЗОЛОМИД) необходимо провести исследование крови с подсчетом количества

клеток. Отмену или снижение дозы препарата ТЕМОЗОЛОМИД следует проводить, руководствуясь таблицей 3.

Таблица 2. Ступени дозирования препарата ТЕМОЗОЛОМИД при адъювантной терапии

Степень	Доза (мг/м ² /день)	Примечание
– 1	100	Уменьшение дозы с учетом предшествующей токсичности (см. таблицу 3)
0	150	Доза во время цикла 1
1	200	Доза во время циклов 2–6 (при отсутствии токсичности)

Таблица 3. Рекомендации по снижению дозы или отмене препарата ТЕМОЗОЛОМИД при адъювантной терапии

Критерий токсичности	Уменьшение дозы препарата ТЕМОЗОЛОМИД на 1 степень (см. таблицу 2)	Прекращение приема препарата ТЕМОЗОЛОМИД
Абсолютное количество нейтрофилов	$<1,0 \times 10^9/\text{л}$	*
Количество тромбоцитов	$<50 \times 10^9/\text{л}$	*
СТС (негематологическая токсичность за исключением алопеции, тошноты и рвоты)	Степень 3	Степень 4*

*Препарат ТЕМОЗОЛОМИД следует отменить, если требуется снижение дозы до $< 100 \text{ мг/м}^2$, а также в случае рецидива негематологической токсичности степени 3 (за исключением алопеции, тошноты и рвоты) после снижения дозы.

Прогрессирующая или рецидивирующая злокачественная глиома в форме мультиформной глиобластомы или анапластической астроцитомы (лечение взрослых и детей старше 3-х лет). Распространенная метастазирующая злокачественная меланома (лечение взрослых)

Пациентам, ранее не получавшим химиотерапию, препарат ТЕМОЗОЛОМИД назначается в дозе 200 мг/м^2 1 раз в день на протяжении 5 дней подряд с последующим перерывом в приеме препарата в течение 23 дней (общая продолжительность одного цикла лечения составляет 28 дней). Для пациентов, ранее проходивших курс химиотерапии, начальная доза составляет 150 мг/м^2 1 раз в день; во втором цикле доза может быть повышена до 200 мг/м^2 в день в течение 5 дней при условии, что в первый день следующего цикла абсолютное количество нейтрофилов не ниже $1,5 \times 10^9/\text{л}$, а количество тромбоцитов не ниже $100 \times 10^9/\text{л}$. Корректировка дозы препарата ТЕМОЗОЛОМИД должна быть основана на

токсичности в соответствии с минимальным значением абсолютного количества нейтрофилов или количества тромбоцитов.

Особые группы пациентов

Дети

Препарат ТЕМОЗОЛОМИД у детей 3 лет и старше следует применять только при рецидивирующей или прогрессирующей злокачественной глиоме. Опыт применения препарата у детей данной возрастной категории очень ограниченный. Данные о применении препарата у детей младше 3 лет отсутствуют.

Пациенты с печеночной или почечной недостаточностью

Фармакокинетические данные темозоломида у пациентов с нормальной функцией печени были сопоставимы с данными у пациентов с печеночной недостаточностью легкой и средней степени. Данные по режиму дозирования темозоломида у пациентов с печеночной недостаточностью тяжелой степени (класс С по классификации Чайлд-Пью) и почечной недостаточностью отсутствуют. Основываясь на данных фармакокинетики, маловероятно, что требуется снижение дозы у пациентов с печеночной недостаточностью тяжелой степени и любой степенью почечной недостаточности. Однако следует соблюдать осторожность при применении препарата ТЕМОЗОЛОМИД у данных групп пациентов.

Пациенты пожилого возраста

На основании данных, полученных методом фармакокинетического анализа у пациентов 19–78 лет, клиренс темозоломида не зависит от возраста. Однако у пациентов пожилого возраста (старше 70 лет) возрастает риск развития нейтропении и тромбоцитопении.

Рекомендации по модификации дозы препарата ТЕМОЗОЛОМИД при лечении прогрессирующей или рецидивирующей злокачественной глиомы или злокачественной меланомы

У пациентов, принимающих препарат ТЕМОЗОЛОМИД, может развиваться миелосупрессия, включая длительную панцитопению. Возможно развитие апластической анемии, которая в единичных случаях приводила к летальному исходу. Развитие апластической анемии также может быть связано с применением ряда препаратов, таких как карбамазепин, фенитоин или сульфаметоксазол/триметоприм, поэтому при одновременном применении препарата ТЕМОЗОЛОМИД и данных препаратов сложно установить причину развития апластической анемии. Начинать лечение препаратом ТЕМОЗОЛОМИД можно только при абсолютном количестве нейтрофилов $\geq 1,5 \times 10^9/\text{л}$ и тромбоцитов $\geq 100 \times 10^9/\text{л}$. Полный клинический анализ крови должен быть выполнен на 22 день (21 день после приема первой дозы), но не позднее 48 ч после этого дня и далее – еженедельно, пока абсолютное

количество нейтрофилов не станет выше $1,5 \times 10^9/\text{л}$, а количество тромбоцитов не превысит $100 \times 10^9/\text{л}$. При абсолютном количестве нейтрофилов ниже $1,0 \times 10^9/\text{л}$ или тромбоцитов ниже $50 \times 10^9/\text{л}$ в ходе любого цикла лечения, доза в следующем цикле должна быть снижена на одну ступень. Возможные дозы: $100 \text{ мг}/\text{м}^2$, $150 \text{ мг}/\text{м}^2$ и $200 \text{ мг}/\text{м}^2$. Минимальная рекомендованная доза составляет $100 \text{ мг}/\text{м}^2$.

Длительность лечения составляет максимально 2 года. При появлении признаков прогрессирования заболевания применение препарата ТЕМОЗОЛОМИД следует прекратить.

Побочное действие

Опыт применения темозоломида в клинических исследованиях

У пациентов, получавших терапию темозоломидом в комбинации с лучевой терапией или при адъювантной терапии после лучевой терапии для лечения впервые выявленной мультиформной глиобластомы, или при адъювантной терапии у пациентов с рецидивирующей или прогрессирующей глиомой, очень часто сообщались сходные нежелательные реакции: тошнота, рвота, запор, анорексия, головная боль и повышенная утомляемость. Очень часто сообщалось о судорогах у пациентов с впервые выявленной мультиформной глиобластомой, получавших адъювантную терапию. Очень часто сообщалось о сыпи у пациентов с впервые выявленной мультиформной глиобластомой, получавших терапию темозоломидом одновременно с лучевой терапией, а также при монотерапии, и часто – при рецидивирующей глиоме. Большинство гематологических нежелательных явлений было зарегистрировано часто или очень часто при обоих показаниях (таблицы 4 и 5); после каждой таблицы представлена частота изменения лабораторных показателей 3–4 степени тяжести.

В таблицах нежелательные явления классифицируются в соответствии с системно-органным классом и частотой. Группы частоты определяются в соответствии со следующей градацией: очень часто ($\geq 1/10$); часто (от $\geq 1/100$ до $< 1/10$); нечасто (от $\geq 1/1000$ до $< 1/100$); редко (от $\geq 1/10000$ до $< 1/1000$); очень редко (от $< 1/10000$). В рамках каждой группы частот нежелательные явления представлены в порядке уменьшения серьезности.

Впервые выявленная мультиформная глиобластома

В таблице 4 указаны нежелательные явления, возникшие после начала лечения у пациентов с впервые выявленной мультиформной глиобластомой во время фазы комбинированной терапии и адъювантной терапии.

Таблица 4. Нежелательные явления, возникшие после начала лечения во время фазы
одновременного лечения и адъювантной терапии у пациентов с впервые выявленной
мультиформной глиобластомой

Системно-органный класс/частота	Комбинированная терапия (лучевая+темозоломид) n=288*	Адъювантная терапия n=224
Инфекционные и паразитарные заболевания		
Часто	прочие инфекции, <i>Herpes simplex</i> , раневая инфекция, фарингит ¹ , кандидоз слизистой оболочки полости рта	прочие инфекции, кандидоз слизистой оболочки полости рта
Нечасто		<i>Herpes simplex</i> , <i>Herpes zoster</i> , гриппоподобный синдром
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы		
Часто	нейтропения, тромбоцитопения, лимфопения, лейкопения	фебрильная нейтропения, тромбоцитопения, анемия, лейкопения
Нечасто	фебрильная нейтропения, анемия	лимфопения, петехии
Нарушения со стороны эндокринной системы		
Нечасто	синдром Иценко-Кушинга	синдром Иценко-Кушинга
Нарушения со стороны обмена веществ и питания		
Очень часто	анорексия	анорексия
Часто	гипергликемия, снижение массы тела	снижение массы тела
Нечасто	гипокалиемия, повышение щелочной фосфатазы, повышение массы тела	гипергликемия, повышение массы тела
Нарушения психики		
Часто	беспокойство, эмоциональная лабильность, бессонница	беспокойство, депрессия, эмоциональная лабильность, бессонница
Нечасто	возбуждение, апатия, поведенческие расстройства, депрессия, галлюцинации	галлюцинации, амнезия
Нарушения со стороны нервной системы		
Очень часто	головная боль	судороги, головная боль
Часто	судороги, снижение сознания, сонливость, афазия, нарушение равновесия, головокружение, спутанность сознания, расстройство памяти, нарушение концентрации внимания, нейропатия ² , парестезия, расстройство речи, тремор	гемипарез, афазия, нарушение равновесия, сонливость, спутанность сознания, головокружение, расстройство памяти, нарушение концентрации внимания, дисфазия, неврологические расстройства (неуточненные), нейропатия ² , периферическая нейропатия, парестезия, нарушения речи, тремор

Нечасто	эпилептический статус, экстрапирамидные расстройства, гемипарез, атаксия, когнитивные нарушения, дисфагия, нарушение походки, гиперестезия, гипестезия, неврологические расстройства (неуточненные), периферическая нейропатия	гемиплегия, атаксия, нарушение координации, нарушение походки, гиперестезия, сенсорное нарушение
Нарушения со стороны органа зрения		
Часто	нечеткость зрения	ограничение поля зрения, нечеткость зрения, диплопия
Нечасто	гемианопсия, снижение остроты зрения, нарушение зрения, дефект поля зрения, боль в глазу	снижение остроты зрения, боль в глазу, сухость глаз
Нарушения со стороны органов слуха и лабиринтные нарушения		
Часто	снижение слуха	снижение слуха, звон в ушах
Нечасто	средний отит, звон в ушах, гиперacusия, боль в ухе ⁴	глухота ³ , головокружение, боль в ухе ⁴
Нарушения со стороны сердца		
Нечасто	сердцебиение	
Нарушения со стороны сосудов		
Часто	кровоизлияния, отеки ⁵ , отеки ног	кровоизлияния, тромбоз глубоких вен, отеки ног
Нечасто	мозговое кровоизлияние, гипертония	эмболия легочной артерии, отеки ⁵ , периферические отеки
Нарушения со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения		
Часто	одышка, кашель	одышка, кашель
Нечасто	пневмония, инфекция верхних дыхательных путей, заложенность носа	пневмония, синусит, инфекция верхних дыхательных путей, бронхит
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта		
Очень часто	запор, тошнота, рвота	запор, тошнота, рвота
Часто	стоматит, диарея, боль в животе, диспепсия, дисфагия	стоматит, диарея, диспепсия, дисфагия, сухость во рту
Нечасто		вздутие живота, недержание кала, желудочно-кишечные расстройства (неуточненные), гастроэнтерит ⁶ , геморрой
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей		
Очень часто	сыпь, алопеция	сыпь, алопеция
Часто	дерматит, сухость кожи, эритема, зуд	сухость кожи, зуд

<i>Нечасто</i>	эксфолиация, реакция фотосенсибилизации, нарушение пигментации	эритема, нарушение пигментации, повышенное потоотделение
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани		
<i>Часто</i>	мышечная слабость, артралгия	мышечная слабость, артралгия, мышечно-скелетные боли, миалгия
<i>Нечасто</i>	миопатия, боль в спине, мышечно-скелетные боли, миалгия	миопатия, боль в спине
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей		
<i>Часто</i>	учащенное мочеиспускание, недержание мочи	недержание мочи
<i>Нечасто</i>		дизурия
Нарушения со стороны половых органов и молочной железы		
<i>Нечасто</i>	импотенция	вагинальные кровотечения, меноррагия, аменорея, вагинит, боль в молочной железе
Общие расстройства и нарушения в месте введения		
<i>Очень часто</i>	усталость	усталость
<i>Часто</i>	аллергическая реакция, лихорадка, лучевое повреждение ⁷ , отек лица, боль, извращение вкуса	аллергическая реакция, лихорадка, лучевое повреждение ⁵ , боль, извращение вкуса
<i>Нечасто</i>	астения, покраснение, ощущение «приливов» жара к телу, ухудшение состояния, дрожь, изменение цвета языка, паросмия, жажда	астения, отек лица, боль, ухудшение состояния, дрожь, нарушения со стороны зубов
Влияние на результаты лабораторных и инструментальных исследований		
<i>Часто</i>	повышение АЛТ	повышение АЛТ
<i>Нечасто</i>	повышение печеночных ферментов, повышение ГГТ, повышение активности АСТ	

*Пациент, который был рандомизирован в группу только лучевой терапии, получал темозоломид + лучевую терапию.

¹ – включая фарингит, назофарингит, стрептококковый фарингит;

² – включая нейропатию, полинейропатию, периферическую сенсорную нейропатию, периферическую моторную нейропатию;

³ – включая глухоту, глухоту двустороннюю, глухоту нейросенсорную, глухоту одностороннюю;

⁴ – включая боль в ухе, дискомфорт в ухе;

⁵ – включая периферическую отечность;

⁶ – включая гастроэнтерит, вирусный гастроэнтерит;

⁷ – включая лучевое поражение, лучевое поражение кожи.

Лабораторные показатели

Была зарегистрирована миелосупрессия (нейтропения и тромбоцитопения), которая является известным дозолимитирующим побочным эффектом для большинства цитотоксических препаратов, включая темозоломид. Когда отклонения лабораторных показателей от нормы и нежелательные явления были объединены для комбинированной фазы и монотерапии, у 8 % пациентов были зарегистрированы отклонения со стороны нейтрофилов 3 или 4 степени тяжести, включая нейтропению. Отклонения со стороны тромбоцитов 3 или 4 степени тяжести, включая тромбоцитопению, были зарегистрированы у 14 % пациентов, получавших темозоломид.

Рецидивирующая или прогрессирующая злокачественная глиома

В клинических исследованиях наиболее частыми возникшими после начала лечения нежелательными явлениями были желудочно-кишечные расстройства, в частности тошнота (43 %) и рвота (36 %). Эти реакции обычно были 1 или 2 степени тяжести (0–5 эпизодов рвоты в течение 24 ч) и либо проходили самостоятельно, либо легко контролировались с помощью стандартной противорвотной терапии. Частота тяжелой тошноты и рвоты составляла 4 %.

В таблице 5 перечислены нежелательные явления, зарегистрированные при рецидивирующей или прогрессирующей злокачественной глиоме во время клинических исследований и в постмаркетинговый период применения темозоломида.

Таблица 5. Нежелательные явления у пациентов с рецидивирующей или прогрессирующей злокачественной глиомой

Инфекционные и паразитарные заболевания	
<i>Редко</i>	оппортунистические инфекции, включая пневмонию, вызванную <i>Pneumocystis jirovecii</i>
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы	
<i>Очень часто</i>	нейтропения или лимфопения (степень 3–4), тромбоцитопения (степень 3–4)
<i>Нечасто</i>	панцитопения, анемия (степень 3–4), лейкопения
Нарушения со стороны обмена веществ и питания	
<i>Очень часто</i>	анорексия
<i>Часто</i>	снижение массы тела
Нарушения со стороны нервной системы	
<i>Очень часто</i>	головная боль
<i>Часто</i>	сонливость, головокружение, парестезия
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения	
<i>Часто</i>	одышка
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта	

<i>Очень часто</i>	рвота, тошнота, запор
<i>Часто</i>	диарея, боль в животе ¹ , диспепсия
<i>Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей</i>	
<i>Часто</i>	сыпь, зуд, алопеция
<i>Очень редко</i>	многоформная эритема, эритродермия, крапивница, экзантема
<i>Общие расстройства и нарушения в месте введения</i>	
<i>Очень часто</i>	усталость
<i>Часто</i>	лихорадка, астения, дрожь, недомогание, боль, нарушение вкуса
<i>Очень редко</i>	аллергические реакции, включая анафилаксию, ангионевротический отек

¹ – включая боль в животе, боль внизу живота, боль вверху живота, дискомфорт в животе.

Результаты лабораторных исследований

Тромбоцитопения и нейтропения 3 или 4 степени были зарегистрированы у 19 % и 17 % соответственно пациентов, получавших лечение по поводу злокачественной глиомы. Это привело к госпитализации и/или прекращению лечения темозоломидом в 8 % и 4 % случаев соответственно. Миелосупрессия была предсказуемой (обычно в течение первых нескольких циклов, с максимальным уровнем цитопении между 21-м днем и 28-м днем), а восстановление было быстрым, обычно в течение 1–2 недель. Признаков кумулятивной миелосупрессии не наблюдалось. Наличие тромбоцитопении может увеличить риск кровотечения, а наличие нейтропении или лейкопении может увеличить риск развития инфекции.

Пол

В популяционном фармакокинетическом анализе опыта применения в клинических исследованиях у 101 женщины и 169 мужчин были доступны данные о минимальном количестве нейтрофилов, и у 110 женщин и 174 мужчин были доступны данные о минимальном количестве тромбоцитов. В первом цикле терапии у женщин в сравнении с мужчинами была зарегистрирована более высокая частота нейтропении 4 степени тяжести (абсолютное количество нейтрофилов $<0,5 \times 10^9/\text{л}$), (12 % в сравнении с 5 %) и тромбоцитопении 4 степени тяжести ($<20 \times 10^9/\text{л}$), (9 % в сравнении с 3 %). У 400 пациентов с рецидивирующей глиомой нейтропения 4 степени тяжести была зарегистрирована у 8 % женщин в сравнении с 4 % мужчин, а тромбоцитопения 4 степени тяжести была зарегистрирована у 8 % женщин в сравнении с 3 % мужчин в первом цикле терапии. В исследовании 288 пациентов с впервые выявленной мультиформной глиобластомой нейтропения 4 степени тяжести была зарегистрирована у 3 % женщин в сравнении с 0 % мужчин, и тромбоцитопения 4 степени тяжести была зарегистрирована у 1 % женщин в сравнении с 0 % мужчин в первом цикле терапии.

Пациенты детского возраста

Темозоломид для перорального применения изучали у пациентов детского возраста (возраст 3–18 лет) с рецидивирующей глиомой ствола головного мозга или рецидивирующей низкодифференцированной астроцитомой в режиме ежедневного приема в течение 5 дней каждые 28 дней. Несмотря на то, что данные ограничены, ожидается, что переносимость у детей будет такой же, как у взрослых. Безопасность темозоломида у детей в возрасте до 3 лет не установлена.

Постмаркетинговый опыт применения

Следующие дополнительные нежелательные явления были зарегистрированы во время постмаркетингового применения:

Таблица 6. Краткий обзор нежелательных явлений, зарегистрированных при лечении темозоломидом в постмаркетинговом периоде

Инфекционные и паразитарные заболевания¹	
<i>Нечасто</i>	цитомегаловирусная инфекция, реактивация таких инфекций как цитомегаловирус, вирус гепатита В ² , герпетический менингоэнцефалит ² , сепсис ²
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы	
<i>Очень редко</i>	длительная панцитопения, апластическая анемия ²
Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования	
<i>Очень редко</i>	миелодиспластический синдром (МДС), вторичные новообразования, включая миелолейкоз
Нарушения со стороны эндокринной системы¹	
<i>Нечасто</i>	несахарный диабет
Нарушения со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения	
<i>Очень редко</i>	интерстициальный пневмонит/пневмонит, легочный фиброз, дыхательная недостаточность ²
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей¹	
<i>Часто</i>	повышение печеночных ферментов
<i>Нечасто</i>	гипербилирубинемия, холестаз, гепатит, повреждение печени, печеночная недостаточность ²
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки	
<i>Очень редко</i>	токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона
<i>Частота неизвестна</i>	лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (DRESS)

¹ – Частота рассчитана на основании соответствующих клинических исследований.

² – Включая случаи с летальным исходом.

Передозировка

Использование препарата в дозах 500, 750, 1000 и 1250 мг/м² (суммарная доза на цикл) было оценено клинически у пациентов. Дозолимитирующей токсичностью была гематологическая токсичность, которая отмечалась при приеме любой дозы, но более выражено – при более высоких дозах. Описан случай передозировки (прием дозы 2000 мг в день в течение 5 дней), в результате которой развились панцитопения, пирексия,

полиорганная недостаточность и смерть. При приеме препарата дольше 5 дней (вплоть до 64 дней), в числе других побочных эффектов отмечалось угнетение кроветворения, осложненное или не осложненное инфекцией, в некоторых случаях длительное и выраженное, с летальным исходом.

Лечение. Антидот к препарату ТЕМОЗОЛОМИД не известен. Рекомендуется гематологический контроль и при необходимости – симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

В отдельном исследовании I фазы назначение темозоломида с ранитидином не приводило к изменениям степени всасывания темозоломида или экспозиции его активного метаболита – МТИК.

На основании популяционного анализа фармакокинетики в исследованиях II фазы совместный прием дексаметазона, прохлорперазина, фенитоина, карбамазепина, ондансетрона, антагонистов H₂-гистаминовых рецепторов или фенobarбитала не изменяет клиренс темозоломида. Совместный прием с вальпроевой кислотой был связан с небольшим, но статистически значимым снижением клиренса темозоломида.

Исследований, направленных на выяснение воздействия темозоломида на метаболизм и выведение других препаратов, не проводилось. В связи с тем, что темозоломид не метаболизируется в печени и слабо связывается с белками, его действие на фармакокинетику других лекарственных средств маловероятно.

Применение темозоломида совместно с другими веществами, угнетающими костный мозг, может увеличить вероятность миелосупрессии.

Пациенты детского возраста.

Исследования взаимодействия проводилось только у взрослых пациентов.

Особые указания

Оппортунистические инфекции и реактивация инфекций

Оппортунистические инфекции (такие как пневмония, вызванная *Pneumocystis jirovecii*) и реактивация инфекций (таких как вирус гепатита В, цитомегаловирус) наблюдались при лечении темозоломидом.

Герпетический менингоэнцефалит

В постмаркетинговый период у пациентов, получавших темозоломид в комбинации с лучевой терапией, наблюдался герпетический менингоэнцефалит (включая случаи с летальным исходом), в том числе при одновременном применении стероидов.

Пневмония, вызванная *Pneumocystis jirovecii*

Пациенты, получавшие комбинированное лечение темозоломидом в сочетании с лучевой терапией в течение 42 дней в пилотном исследовании, имели высокий риск развития пневмонии, вызванной *Pneumocystis jirovecii*. В связи с этим рекомендуется проведение профилактического лечения против возбудителя *Pneumocystis jirovecii* пациентам, получающим комбинированное лечение с лучевой терапией в рамках 42-дневной схемы (вплоть до 49 дней) независимо от количества лимфоцитов. При развитии лимфопении, пациенты должны продолжать профилактику до разрешения лимфопении до ≤ 1 степени. Может наблюдаться более высокая частота возникновения пневмонии, вызванной *Pneumocystis jirovecii*, при приеме темозоломида в более длительном режиме. Однако все пациенты, получающие темозоломид, особенно пациенты, получающие стероиды, подлежат пристальному наблюдению в отношении развития пневмонии, вызванной *Pneumocystis jirovecii*, независимо от схемы лечения. Были зарегистрированы случаи дыхательной недостаточности с летальным исходом у пациентов, получающих темозоломид, в частности в комбинации с дексаметазоном или другими стероидами.

Вирус гепатита В

Сообщалось о случаях гепатита, вызванных реактивацией вируса гепатита В, включая случаи с летальным исходом. Перед началом лечения у пациентов с положительными результатами серологического исследования на вирус гепатита В (в том числе с активным заболеванием) следует проконсультироваться со специалистами в области заболеваний печени. Во время лечения пациенты подлежат наблюдению и соответствующему лечению.

Гепатотоксичность

У пациентов, получавших темозоломид, были зарегистрированы случаи поражения печени, в том числе случаи печеночной недостаточности с летальным исходом. Перед началом лечения необходимо проводить контроль функции печени. Если показатели превышают норму, врач должен оценить пользу/риск до начала терапии, включая риск развития печеночной недостаточности с летальным исходом. На 42 день лечения (в середине цикла лечения) необходимо повторно провести контроль функции печени. У всех пациентов необходимо контролировать функцию печени после каждого цикла лечения. У пациентов со значительными отклонениями функции печени необходимо оценить пользу/риск продолжения терапии. Токсическое поражение печени может возникнуть через несколько недель и более после окончания применения препарата.

Злокачественные заболевания

Также очень редко наблюдались случаи миелодиспластического синдрома и вторичные злокачественные заболевания, в том числе миелолейкоз.

Противорвотная терапия

Тошнота и рвота часто связаны с приемом препарата ТЕМОЗОЛОМИД.

Противорвотная терапия может применяться до или после введения темозоломида.

Впервые выявленная мультиформная глиобластома у взрослых пациентов

Противорвотная терапия рекомендуется перед началом комбинированной фазы и настоятельно рекомендуется во время фазы монотерапии.

Пациенты с рецидивирующей или прогрессирующей глиомой

Пациентам, у которых наблюдалась тяжелая (степень 3 или 4) рвота в предыдущих циклах лечения, может потребоваться противорвотная терапия.

Лабораторные показатели

У пациентов, получающих темозоломид может развиваться миелосупрессия, включая длительную панцитопению, которая может приводить к апластической анемии, которая в некоторых случаях приводила к летальному исходу. Развитие апластической анемии также может быть связано с применением ряда препаратов, таких как карбамазепин, фенитоин или сульфаметоксазол/триметоприм, поэтому при одновременном применении препарата ТЕМОЗОЛОМИД и данных препаратов сложно установить причину развития апластической анемии. Вводить препарат ТЕМОЗОЛОМОД можно только при абсолютном числе нейтрофилов $\geq 1,5 \times 10^9/\text{л}$ и тромбоцитов $\geq 100 \times 10^9/\text{л}$. Клинический анализ крови должен быть выполнен на 22-й день (через 21 день после получения первой дозы) или в течение 48 ч с этого дня и еженедельно до тех пор, пока абсолютное число нейтрофилов не составит $> 1,5 \times 10^9/\text{л}$ и количество тромбоцитов не составит $> 100 \times 10^9/\text{л}$. При абсолютном числе нейтрофилов ниже $1,0 \times 10^9/\text{л}$ или тромбоцитов ниже $50 \times 10^9/\text{л}$ в ходе любого цикла лечения доза в следующем цикле должна быть снижена на одну ступень (на $50 \text{ мг}/\text{м}^2$). Уровни дозы включают $100 \text{ мг}/\text{м}^2$, $150 \text{ мг}/\text{м}^2$ и $200 \text{ мг}/\text{м}^2$. Минимальная рекомендуемая доза составляет $100 \text{ мг}/\text{м}^2$.

Дети

Нет клинических данных по применению темозоломида у детей младше 3 лет. Опыт применения у детей ограничен.

Пациенты пожилого возраста (старше 70 лет)

В клинических исследованиях у пожилых пациентов наблюдался повышенный риск развития нейтропении и тромбоцитопении по сравнению с более молодыми пациентами, поэтому требуется особая осторожность при применении темозоломида у пожилых пациентов.

Пациенты мужского пола

Мужчины репродуктивного возраста во время лечения препаратом ТЕМОЗОЛОМИД и, как минимум, в течение 6 месяцев после окончания должны использовать надежные методы контрацепции.

Перед началом лечения рекомендуется обсудить возможность криоконсервации спермы.

Лактоза

Препарат ТЕМОЗОЛОМИД содержит лактозу. Пациентам с наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы и глюкозо-галактозная мальабсорбция не следует применять препарат ТЕМОЗОЛОМИД.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Некоторые побочные эффекты препарата ТЕМОЗОЛОМИД, такие как сонливость и чувство усталости, могут отрицательно влиять на способность управления транспортными средствами или выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. В связи с этим следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами.

Форма выпуска

Капсулы, 20 мг, 100 мг, 140 мг, 180 мг, 250 мг.

По 5 или 20 капсул в полиэтиленовый флакон высокой плотности, укупоренный полипропиленовой крышкой с влагопоглотителем и контролем первого вскрытия. На флакон наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся.

По 5 или 20 капсул в стеклянный флакон коричневого стекла, укупоренный полиэтиленовой крышкой. На флакон наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению, помещают в пачку картонную.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель

ООО «ИИХР», Россия

Московская обл., г.о. Химки, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1

Держатель РУ и Организация, принимающая претензии от потребителя


ООО «ИИХР», Россия

141401, Московская обл., г.о. Химки, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1

тел.: +7 (495) 995-49-41, www.iihr.ru

Генеральный директор

ООО «ИИХР»



Н.А. Папазова